

STODAL®

Sirup

Perorální podání (k vnitřnímu užití)

SLOŽENÍ

100g sirupu obsahuje:

Léčivé látky:

DROSERA – TINCTURA BASICA A.U.H.	0,95g
BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS	19,0g
POLYGALAE SENEGAE SIRUPUS	19,0g
PULSATILLA 6CH	0,95g
RUMEX CRISPUS 6CH	0,95g
BRYONIA 3CH	0,95g
IPECACUANHA 3CH	0,95g
EUSPONGIA OFFICINALIS 3CH	0,95g
STICTA PULMONARIA 3CH	0,95g
KALII STIBII TARTRAS 6CH	0,95g
MYOCARDIUM 6CH	0,95g
DACTYLOPIUS COCCUS 3CH	0,95g

Pomocné látky:

ethanol 96%, karamel, kyselina benzoová, prostý sirup (složený ze sacharózy a čištěné vody)

INDIKAČNÍ SKUPINA

Fytofarmakum – expektorans.

CHARAKTERISTIKA

Hlavním nositelem účinku jsou rostlinné extrakty zmírňující kašel, usnadňující vykašlávání, chránící sliznice dýchacích cest a působící antisepticky.

INDIKACE

Kašle různého původu.

Přípravek mohou užívat dospělí i děti a mladiství.

KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost na některou složku přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou dosud známy.

Při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí zastavte užívání a vyhledejte lékaře.

INTERAKCE

Nejsou dosud známé.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Děti od 1 roku:

1 čajovou lžičku 3-5x denně.

Dospělí a mladiství:

1 polévkovou lžičku 3-5x denně.

UPOZORNĚNÍ

Bez porady s lékařem přípravek neužívejte déle než 2 týdny.

Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poradte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jedna dávka pro děti (čajová lžička sirupu) obsahuje: 3,7 g sacharózy.

Jedna dávka pro dospělé (polévková lžička sirupu) obsahuje: 11,1g sacharózy.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Přípravek obsahuje 1,74 objemových % alkoholu.

Jedna dávka pro děti (čajová lžička sirupu) obsahuje: 68,67mg alkoholu. Dávka pro děti obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Jedna dávka pro dospělé a mladistvé (polévková lžička sirupu) obsahuje: 206 mg alkoholu. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Možnost ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je nepravděpodobná.

VAROVÁNÍ

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

BALENÍ

Lékovka 200 ml.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:

BOIRON S.A. , 20, rue de la Libération, 69110 Ste Foy-les-Lyon, Francie.

Datum poslední revize 27. 10. 2010

Registrační číslo 94/ 700/92-C

Tento lék je volně prodejný a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.